




Μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο
Έλεγχος παραφυάδων
Αποξηραντικό

ΓΡΗΓΟΡΟ, ΕΥΚΟΛΟ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ



- Αποτελεσματικό σε πλατύφυλλα ζιζάνια, ακόμα και ανθεκτικά σε άλλα ζιζανιοκτόνα
- Άριστος έλεγχος παραφυάδων
- Αποξηραντικό πατάτας
- Εγκεκριμένο για ευρύ φάσμα καλλιεργειών

A.N. Nicolaou
Agrochemicals

A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd
Mail: Agiou Georgiou Makri 44 str., 6036 Larnaca, Cyprus
Office: 0035724426515 / Fax: 0035724426514
Email: nicolaouagrochemicals@cytanet.com.cy
Web.: nicolaouagrochemicals.com

ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ


Ανήκει στη χημική ομάδα των phenylpyrazole (φαινυλοπυραζόλια). Η δραστική ουσία pyraflufen-ethyl είναι αναστολέας του ενζύμου οξειδάση του πρωτοπορφυρινογόνου (protoporphyrinogen oxidase - PPO), παρεμποδίζοντας τους φωτοσυνθετικούς δίαυλους του φυτού.

ΠΩΣ ΔΡΑ

- Δρα μόνο με επαφή και απορροφάται αποκλειστικά από τα πράσινα μέρη των φυτών (φύλλα, παραφυάδες).
- Απορροφάται πολύ γρήγορα και η νέκρωση των ζιζανίων επέρχεται σε λίγες μέρες.
- Η δράση του βελτιώνεται με συνθήκες έντονου ηλιακού φωτισμού.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται καθ' όλη την διάρκεια του έτους ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων.



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποξήρανση στελεχών πατάτας



Καθολικός
ψεκασμός
φυλλώματος.

Αντιμετώπιση ζιζανίων στην πατάτα



Προφυτρωτικά
ή νωρίς
μεταφυτρωτικά.

Αντιμετώπιση ζιζανίων στην τομάτα πριν τη μεταφύτευση



Καθολικός
ψεκασμός.

Αντιμετώπιση ζιζανίων στην τομάτα μετά τη μεταφύτευση




Κατευθυνόμενος
ψεκασμός μεταξύ
των γραμμών
φύτευσης με χρήση
προστατευτικών
καλύπτρων.

Αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων και αποξήρανση παραφυάδων



Κατευθυνόμενος ψεκασμός
με χρήση προστατευτικών
καλύπτρων.
Εφαρμόζεται χωρίς να έρθουν
σε επαφή τα σταγονίδια
με τα διάφορα μέρη των
καλλιεργειών.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΖΙΖΑΝΙΑ



ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Πατάτα:	Αγριοτομάτα, Στύφνος, Αντράκλα, Βλήτο τραχύ, Λουβουδιά, Πολυκόμπι, Πολύγωνο
Αμπέλι, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα, Ακτινίδιο, Ελιά	Αγριομάρουλο, Αναγαλλίδα, Αντράκλα, Βερόνικα, Βλήτο τραχύ, Γεράνι, Επιλόβιο, Ζωχός, Καρδαμίνη, Καψέλλα, Κόνυζα, Λουβουδιά, Μαρτιάκος, Μολόχα, Μύαγρο, Παπαρούνα κοινή, Πολυκόμπι, Σκαρολάχανο, Στελλάρια, Τοριλίδα, <i>Acalypha virginica</i> , <i>Chamaesyce prostrata</i> / <i>Euphorbia prostate</i> , <i>Diplotaxis erucoides</i>
Τομάτα (Υ):	Αγριοπιπεριά, Αγριοτομάτα, Στύφνος, Αντράκλα, Βλήτο τραχύ, Λουβουδιά, Περιπλοκάδα,
Αγκινάρα:	Αγριοτομάτα, Στύφνος, Αντράκλα, Βλήτο άσπρο, Βλήτο τραχύ, Ζωχός, Καπνόχορτο, Λουβουδιά, Μολόχα, Περιπλοκάδα, Σισύμπριο, Τσουκνίδα μικρή, <i>Chenopodium murale</i> , <i>Diplotaxis virgata</i>
Μπανάνα:	Αγριοτομάτα, Στύφνος, Βλήτο καλλιεργούμενο, Λουβουδιά, Ζωχός πολυετής, Κόνυζα,

Κάτοχος Άδειας	Nichino Europe Co Limited
Αποκλειστικός Διανομέας	A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd
Σύνθεση	Pyraflufen-ethyl 10,6 g/L
Μορφή σκευάσματος	Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)